

Вакцинация против полиомиелита в дошкольных образовательных организациях

Начальник отдела мониторинга организации медицинской помощи
матери и ребенку ГКУ НО «Центр медицинской инспекции»

Зайцева Марина Владимировна

2022 г.


Вакцинопрофилактика в Российской Федерации организована в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2021 г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»



НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК
в соответствии с приложением №1 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06 декабря 2021 г. № 1122н

Возраст	ДЕТИ												ВЗРОСЛЫЕ								
	МЕСЯЦЫ												ГОДЫ								
	0	1	2	3	4,5	6	12	15	18	20	6	7	12	14	15-17	18-25	26-35	36-55	56-59	60+	
Инфекции	3-7 л.																				
Туберкулез	V1	V2				V3							RV								
Гепатит В	V1	V2	V3				V4														
Пневмококковая инфекция			V1		V2				RV												
Коклюш																					
Дифтерия				V1	V2	V3			RV1				АДС-м		АДС-м					Каждые 10 лет с момента последней ревакцинации (АДС-м)	
Столбняк													RV2	RV3	RV2						
Полиомиелит				V1	V2	V3			RV1	ОПВ	RV2	RV3	ОПВ								
Гемофильная инфекция				V1	V2	V3			RV	ИПВ	RV2	RV3	ИПВ								
Корь																					
Краснуха							V1						RV							Женщинам	
Эпидемический паротит																					
Грипп																					
	ЕЖЕГОДНО																				

V1, V2, V3 - Порядковый номер вакцинации
RV1, RV2, RV3 - Порядковый номер ревакцинации
ИПВ - Инактивированная полиомиелитная вакцина
ОПВ - Оральная полиомиелитная вакцина
АДС-м - Анатоксин дифтерийно-столбнячный с уменьшенным содержанием антигенов
Все м лицам
Лицам из групп риска, по показаниям, призванным (грипп)
Ранее не привитым, не болевшим, не имеющим сведений и однократно привитым (для кори и краснухи)



В соответствии с вышеуказанным документом:



вакцинация против полиомиелита проводится в возрасте **3; 4,5; 6 месяцев**;
ревакцинация – в **18; 20 месяцев и 6-7 лет**



Вакцинация и первая ревакцинация проводятся инактивированной полиомиелитной вакциной (**ИПВ**)





Вторая и третья ревакцинация здоровым детям проводятся оральной полиомиелитной вакциной (**ОПВ**), детям из групп риска - **ИПВ**



В соответствии с п. 2513 Постановления
Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от
28.01.2021 № 4 «Об утверждении
санитарных правил и норм [СанПиН
3.3686-21](#) «Санитарно-
эпидемиологические требования по
профилактике инфекционных болезней»

**В дошкольных организациях
проводят разобщение детей, не
имеющих сведений об иммунизации
против полиомиелита, не привитых
против полиомиелита или
получивших менее 3 доз
полиомиелитной вакцины, с детьми,
привитыми вакциной ОПВ в течение
последних 60 календарных дней, на
срок 60 календарных дней с момента
получения детьми последней
прививки ОПВ.**

Отсутствие разобщения детей может привести к развитию у непривитого ребёнка вакциноассоциированного паралитического полиомиелита.



Предлагаем:

- Информировать родителей о необходимости своевременной вакцинации детей
- Совместно с медицинскими работниками разрабатывать план-график вакцинации детей против полиомиелита в учреждении